



GIBERELINA GA3 = STYMULATOR / REGULATOR WZROSTU / FITOHORMONY

GIBERELINY - Stymulują naturalny wzrost i rozwój roślin, mając często spektakularne efekty, które zyskały uwagę specjalistów w ostatnim dziesięcioleciu ponieważ osiągnięto znakomite wyniki w produkcji rolnej, ogrodnictwie, leśnictwie i hodowli roślin leczniczych.

Główne zmiany zachodzące w metabolizmie roślin dzięki giberelinom to:

- zwiększone wydzielanie wody i zwiększone zużycie wody
- intensyfikacja fotosyntezy
- stymulowanie oddychania podczas kiełkowania nasion
- opóźnienie starzenia się tkanek roślinnych
- korygowanie negatywnych skutków wirusów i Botrytis
- niska zawartość skrobi u roślin i nasion kiełkujących



Gibereliny zostały odkryte i stosowane od ponad 100 lat na całym świecie w celu stymulowania wzrostu roślin.

Zaobserwowano wzrost po zastosowaniu GA3 przy testowaniu na uprawach nienawożonych w granicach 16-19%.

OGÓLNE INSTRUKCJE DOT STOSOWANIA WYROBU

- Rozpuścić 3 gramy kwasu giberelinowego w 100 l wody, a następnie dodać 400 l wody. Uzyskujecie roztwór 500 L. Czas rozpuszczania to co najmniej 8 minut.
- Należy podawać przez rozpylanie, na liściach, 2-3 krotnie, w postaci roztworu w ilości 500 l / ha na każde stosowanie.
- Zaleca się stosować bezpośrednio po przygotowaniu roztworu, w celu uniknięcia degradacji. Produkt jest słabym kwasem organicznym i ulega zmianom w alkalicznych wodach. Z tego samego powodu, nie należy mieszać go z innymi substancjami.
- Zaleca się stosowanie w chłodnej pogodzie (rano lub wieczorem), nie w pełnym słońcu.

- Jeśli w ciągu 8 godzin od aplikacji mocno pada, działanie produktu może być ograniczone. W tym przypadku zaleca się ponowne zastosowanie o stężeniu 50% w stosunku do początkowego stosowania.
- **Nie mieszać** produktu z innymi pestycydami lub innymi nawozami dolistnymi, aby uniknąć degradacji / przemiany substancji czynnej.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA DLA PRZYKŁADOWYCH ROŚLIN

Dla SŁONECZNIKA należy zastosować dwa (2) zabiegi:

- Faza I, przy powstaniu 3 - 4 liści
- Faza II, przy powstaniu 10 - 12 liści.

Dla POMIDORÓW należy zastosować trzy (3) zabiegi:

- Faza I po posadzeniu, przed kwitnieniem
- Faza II po kwitnieniu
- Faza III na początku wiązania kwiatów

Dla WINOROŚLI należy zastosować trzy (3) zabiegi:

- Faza I, przed kwitnieniem
- Faza II po kwitnieniu
- Faza III na początku formowania gron

Dla ZIEMNIAKÓW należy zastosować trzy (3) zabiegi:

- Faza I, 10 - 15 dni po pokazaniu się pierwszych liści
- Faza II, 2 - 3 tygodnie po pierwszym zabiegu
- Faza III, na początku powstawania bulw



Stosować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie charakterystyki!